

Bruyère quaternée

<p>Période de Floraison</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">E</div> <div style="background-color: orange; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">A</div> </div>	<p>Couleur de fleur</p> 
<p>Identité Famille : Ericacées Nom latin : Erica tetralix Nom français : Bruyère quaternée, Bruyère tétragone, Caminet, Clarin</p>	<p>Photo</p>  <p style="text-align: right;">1</p>
<p>Lieux fréquentés sur le territoire de La Lande Chasles : Elle préfère les zones humides et on la trouve par exemple dans les fossés du chemin en face des Planches. <u>Remarques</u> : 3 bruyères de moins d'1 m de haut ont été observées sur la commune. La bruyère cendrée n'a pas de poils sur le pourtour des feuilles (qui sont toujours par 3), contrairement aux 2 autres. La bruyère ciliée a des cils autour des feuilles (qui sont par 3 ou 4) et des fleurs assez grosses tournées d'un seul côté, alors qu'elles sont en petit bouquet terminal chez la bruyère quaternée (dont les feuilles sont toujours par 4). Les callunes, proches des bruyères, s'en distinguent par leurs feuilles imbriquées, donnant un aspect de petite tresse. Chez les bruyères, les feuilles sont juste groupées par 3 ou 4 autour de la tige.</p>	<p>Particularités : Arbrisseau bas, de 15 à 50 cm, grisâtre, poilu. Les feuilles persistantes étroites, simples et coriaces, sont groupées par 4 autour de la tige. Les fleurs de 6 à 7 mm de long, roses, globuleuses, en grappes courtes et serrées, forment des petits bouquets à l'extrémité des tiges, et apparaissent de juin à octobre. C'est une plante mellifère.</p>
<p>Autres photos</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p style="text-align: center;">1 1 1</p>	