

Fougère étalée

<p>Période de Fructification</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: yellow; padding: 2px 5px; border: 1px solid black;">E</div> <div style="background-color: #f4a460; padding: 2px 5px; border: 1px solid black;">A</div> </div>	<p>Couleur de fleur</p> <p style="text-align: right;">X Pas de fleur</p>
<p>Identité Famille : Dryoptéridacées (Fougères) Nom latin : Dryopteris affinis, Dryopteris borrieri, Dryopteris pseudomas Nom français : Fougère étalée, Dryoptéris étalé, Dryoptéris fausse fougère mâle, Fougère mâle affine.</p>	<p>Photo</p>  <p style="text-align: right;">1</p>
<p>Lieux fréquentés sur le territoire de La Lande Chasles : Elle est présente en particulier dans le fossé entre Les Planches et les Landelles. <u>Remarque</u> : elle peut être confondue avec la fougère mâle, mais les feuilles de la fougère étalée sont beaucoup plus luisantes, les découpes secondaires ne vont pas jusqu'à la nervure centrale, et une tache noire est présente au niveau de chaque découpe, ce qui n'est pas le cas chez la fougère mâle. Par contre, elle peut se croiser (s'hybrider) avec la fougère mâle, ce qui donne des plantes intermédiaires.</p>	<p>Particularités : La fougère étalée est généralement une grande fougère (plus grande que la fougère mâle). Les feuilles sont présentes de mai à novembre. Elle a des limbes luisants et une tache violacée/noire à l'intersection des lobes et de l'axe de la feuille (appelé le rachis : voir 3^{ème} photo ci-dessous). Les lobes sont aussi moins découpés que chez la fougère mâle (bords plus ou moins parallèles, présence de peu de dents et seulement à l'extrémité : 2^{ème} photo ci-dessous). Les pétioles (queues) sont recouverts d'écailles brun doré. Les fructifications (les sores) sont mûres en août – septembre.</p>
<p>Autres photos</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div> <p style="text-align: center;">1 1 1 1</p>	